

NOTA CIENTIFICA

APORTES AL CONOCIMIENTO DE LAS FORMICIDAE (HYMENOPTERA) DE LA PAMPA, ARGENTINA.II.

Estela Quirán y Adriana Casadio¹

Se conoce la presencia de numerosas Formicidas en la región semiárida pampeana, pero el relevamiento taxonómico es aún incompleto.

Las autoras realizaron campañas de recolección en las localidades de Luan Toro (36°12' Lat.Sur y 65°06' Long.Oeste) y El Tropezón (36°40' Lat.Sur y 64°55' Long.Oeste) durante diciembre de 1987. El material estudiado se encuentra depositado en las colecciones de la cátedra Zoología Invertebrados II, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam. En la presente nota se citan las especies coleccionadas, señalándose con un asterisco los registros nuevos para la provincia.

RESULTADOS

Subfamilia Myrmicinae

Pogonomyrmex inermis Forel. Luan Toro, 17 obreras.

* *P. lobatus* Santschi. Luan Toro, 26 obreras.

* *P. bruchi* Forel. Luan Toro, 20 obreras.

* *Crematogaster brevispinosa* Mayr. Luan Toro, seis obreras.

Ephebomyrmex abdominalis Santschi. Luan Toro, 13 obreras.

Solenopsis interrupta Santschi. Luan Toro y El Tropezón, 17 obreras, tres hembras, siete soldados.

Pheidole bergi Mayr. Luan Toro, 21 obreras, ocho soldados.

Subfamilia FORMICINAE

* *Camponotus crassus* Mayr. Luan Toro, ocho obreras.

Subfamilia DOLICHODERINAE

Forelius nigriventris Forel. Luan Toro, 10 obreras.

Forelius rubriceps Forel. Toay, 18 obreras, 24-XII-83; col. G. Aimar.

Observaciones: en una nota anterior (1988. Rev.Fac.Agr. UNLPam, 3(1):99-105); las autoras señalan a *Forelius rufus* Gallardo para la entomofauna pampeana, la cita correcta corresponde a *F. Rubriceps* Forel.

⁽¹⁾ Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de La Pampa.